

SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ		BETEGTÁJÉKOZTATÓ KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI OSZTÁLY		FNY1028/11-2016.04.21.
Tárgy: Betegtájékoztató ultrahang kontrasztanyag vizsgálatához				Változat: 1
Tárgy: Betegtájékoztató ultrahang kontrasztanyag vizsgálatához				Oldalszám: 1/2
Készítette:	Ellenőrizte:	Jóváhagyta:	Dátum:	
Dr. Bártfai Katalin részlegvezető főorvos	Dr. Unger Zsuzsa Ph.D mb. osztályvezető főorvos	Dr. Kerkovits András orvosigazgató helyettes	2016. 04. 21.	

BETEGTÁJÉKOZTATÓ ULTRAHANG KONTRASZTANYAGOS VIZSGÁLATHOZ

Tájékoztató:

Az Ön esetében az ultrahang vizsgálat pontosságát növeli, azt kiegészíti a kontrasztanyag (SonoVue) ultrahang vizsgálat. A vizsgálat az Ön érdekeit szolgálja és melyet csak beleegyezése esetén végezzük el.

A vizsgálat lényege:

A SonoVue a véredények és testszövetek ultrahangvizsgálatánál használt kontrasztanyag.

A SonoVue több millió apró buborékot (mikrobuborékot) tartalmazó diszperzió. Minden buborék kisebb, mint egy vörösvértest. A buborékok visszaverik az ultrahang nyalábot, a testszövetektől eltérően és így javítják a képminőséget. Megkönnyíti az orvos számára a vizsgált testrészt vagy véredény felismerését, illetve a rendellenességek észlelését. A SonoVue segítségével vizsgálhatók a szívüregek, a nagy véredények, erek, valamint a legtöbb hasi szerv, így a máj és a vese szerkezete, erezettsége, vérellátása.

A gyógyszer kizárólag diagnosztikus célra készült, azonban segítségével bizonyos terápiás eljárások – mint például a radiofrekvenciás kezelés, selectív chemoembolisatio, angioplastica – eredményessége is jól feltérképezhető.

Mellékhatások:

A SonoVue klinikai vizsgálataiban tapasztalt legtöbb mellékhatás enyhe és átmeneti volt. A leggyakrabban észlelt mellékhatások: fejfájás, hányinger, fájdalom, égő, horzsoló érzés vagy zsibbadás az injekció helyén.

A ritkábban tapasztalt mellékhatások: viszketés, kiütés, hasi, mellkasi vagy hátfájdalom, fájdalom általában, értágulat, vércukorszint emelkedése, homályos látás, torok irritáció, melléküregi nyomásemelkedés, testrészek zsibbadása, szédülés, alvászavar, elgyengülés, furcsa ízérzés.

Ön nem kaphat SonoVue-t, ha:

- myocardialis infarctusa (szívrohama) volt és még mindig gyakori és/vagy ismételt szívújéki vagy mellkasi fájdalmat érez,
- a közelmúltban szívkoszorúér beavatkozása volt,
- gyakori és/vagy ismételt szívújéki vagy mellkasi fájdalmat érzett az elmúlt 7 napon belül
- szívelégtelenségben szenved (NYHA III-IV),
- súlyos ritmuszavara van,
- szívében jobb-bal sönt van,
- súlyos mértékben emelkedett a tüdőartériák nyomása,
- beállíthatatlan magas vérnyomása van,
- felnőttkori légzési distressz szindrómája van.

SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ	BETEGTÁJÉKOZTATÓ KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI OSZTÁLY	FNY1028/11-2016.04.21. Változat: 1
Tárgy: Betegtájékoztató ultrahang kontrasztanyagossal vizsgálatához		Oldalszám: 2/2

Terhesség

A SonoVue-t nem vizsgálták terhes nőknél, ezért ilyenkor nem alkalmazzuk. A fejlődő magzatra várhatóan nem jelent veszélyt, de ez irányú statisztikai adat nem áll rendelkezésünkre. Ha terhes vagy úgy gondolja, hogy terhes lehet, közölje orvosával.

Szoptatás

Ha szoptat, közölje orvosával. Nem ismeretes, hogy a SonoVue átjut-e az anyatejbe.

A kezelés ideje alatt alkalmazott egyéb gyógyszerek:

A SonoVue és egyéb gyógyszerek között nem jeleztek kölcsönhatást. Mégis arra kérjük, hogy tájékoztassa a kezelőorvosát a jelenleg szedett gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható gyógyszereket is.

A betegtájékoztató érvényességi ideje: visszavonásig.