

SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ		BETEGTÁJÉKOZTATÓ KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI OSZTÁLY		FNY1028/24-2017.11.28.
Tárgy: Betegtájékoztató kontrasztanyag oszlop-, gyomor-, vékony- és vastagbél vizsgálatokhoz				Változat: 2
Tárgy: Betegtájékoztató kontrasztanyag oszlop-, gyomor-, vékony- és vastagbél vizsgálatokhoz				Oldalszám: 1/1
Készítette:	Ellenőrizte:	Jóváhagyta:	Dátum:	
Dr. Proksa Katalin főorvos	Dr. Tompa Tamás mb. osztályvezető főorvos	Dr. med. habil. Sziller István orvosigazgató helyettes	2017. 11. 28.	

BETEGTÁJÉKOZTATÓ KONTRASZTANYAGOS NYELÉS-, GYOMOR-, VÉKONY- ÉS VASTAGBÉL VIZSGÁLATOKHOZ

A Képző Diagnosztikai Osztályon **nyelés, gyomor** valamint **irrigoscopiás** vizsgálatokat végzünk adott kontrasztanyaggal.

A tápcsatorna (nyelőcső, gyomor, vékonybél, vastagbél) kontrasztanyag adásával végzett *funkcionális vizsgálata* olyan, más módon nem megszerezhető információkat ad a fenti szervek állapotáról és működéséről, amik elengedhetetlenek a bajmegállapítás, vagy a további kezelések szempontjából.

A beavatkozás elmaradása esetén a tápcsatorna érintett szakaszának állapotát sok esetben nem tudjuk kellő alaposan és funkciójában megítélni. Ez hátrányt jelenthet a diagnózis vagy a kezelések, illetve az esetleges szövődmények korrekt ellátása vonatkozásában.

Minden kontrasztanyag vizsgálatnak lehetnek szövődményei, melyek esetünkben az alábbiak:

Nyelés és gyomor vizsgálat esetén: aspiráció (a kontrasztanyag légzőszervbe jutása), nem ismert testüregek közötti kommunikáció esetén gyulladáshoz vezető reakciók stb.

Irrigoscopia esetén: perforáció (a bélfal kóros megnyílása).

Ezek a szövődmények 0,1-1 % közötti valószínűséggel fordulhatnak elő a legnagyobb gondosság mellett is. A szövődmények elkerülése céljából a vizsgálatok előtt betegeinket részletesen kikérdezzük, amely a gyomor- és nyelésvizsgálatok esetén a kontrasztanyag kiválasztását nagyban befolyásolja (pl.: ismert félrenyeléses panaszok esetén vízdékony kontrasztanyagot alkalmazunk).

Irrigoscopiás vizsgálatok elvégzésekor nagy körültekintéssel használjuk a levegő/kontrasztanyag adagolását. A vizsgálatot megelőzően rectoscopiát (végbéltükrözést) kérünk az esetleges diverticulosis, valamint a már fennálló szűkületek kimutatása céljából.

A betegtájékoztató érvényességi ideje: visszavonásig.