

SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ		BETEGTÁJÉKOZTATÓ KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI OSZTÁLY		FNY1028/4-2016.04.21.
				Változat: 1
Tárgy: Betegtájékoztató a helicobacter pylori fertőzés kimutatásához				Oldalszám: 1/1
Készítette:	Ellenőrizte:	Jóváhagyta:	Dátum:	
Dr. Bártfai Katalin részlegvezető főorvos	Dr. Unger Zsuzsa Ph.D mb. osztályvezető főorvos	Dr. Kerkovits András orvosigazgató helyettes	2016. 04. 21.	

BETEGTÁJÉKOZTATÓ A HELICOBACTER PYLORI FERTŐZÉS KIMUTATÁSÁHOZ

Tájékoztató:

A vizsgálat elvégzésének feltételei:

A vizsgálat éhgyomorral történik. A beteg a vizsgálat előtt 4 órával ne egyen, csak tiszta vizet fogyaszthat.

Savlekötő gyógyszert, a vizsgálatot megelőző 7 napban ne vegye be.

Antibiotikumot, a vizsgálatot megelőző 30 napban nem szedhet.

Kontroll vizsgálat esetén (előző pozitív vizsgálat után), az antibiotikum kúra után min. 30 napnak kell eltelnie.

A vizsgálat menete:

1. A páciens egy igen csekély mennyiségű radioaktív izotópot (C-14) tartalmazó kapszulát vesz be egy pohár vízzel, ezután 10-15 perc várakozási idő következik.
2. A várakozási idő eltelte után egy teszt-zacskóba kell lélegezni.
3. A teszt zacskón található színekódolt indikátor jelzi, hogy mikor lehet befejezni a befűjást. (kb. 1-4 perc)
4. A páciens ekkor a teszt zacskót átadja az asszisztensnek, számára a vizsgálat befejeződött. A teszt ezután a mérőkészülékbe kerül.
5. A vizsgálat eredménye a vizsgálat napján délutántól a kórház számítógépes rendszerében megtalálható.

A C 14 a természetben is előforduló radioaktív izotóp, ami a levegőben és az emberi szervezetben is megtalálható. A vizsgálat során a beteg szervezetét csekély mennyiségű sugárterhelés éri, ami hozzávetőlegesen a természetes háttérsugárzásból 24 óra alatt szerzett sugárterheléssel egyenértékű.

A vizsgálat nem javasolt várandós nőknek, szoptatás alatt és 18 éven aluliaknak.

Kérjük, ha a fenti állapotok közül valamelyik igaz önre, feltétlenül jelezze az orvosnak vagy az asszisztensnek!

A betegtájékoztató érvényességi ideje: visszavonásig.