

SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ	BETEGTÁJÉKOZTATÓ KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI OSZTÁLY	FNY1028/7-2020.06.03.
Tárgy: Betegtájékoztató angiográfiás vizsgálathoz		Változat: 2
		Oldalszám: 1/1

BETEGTÁJÉKOZTATÓ ANGIOGRÁFIÁS VIZSGÁLATHOZ

Tájékoztató:

Az angiológus, az érsebész és az intervenció radiológus szakmai konzíliuma és egyetértése alapján érfestésre van szükség. Ez a vizsgálat elengedhetetlenül fontos az érrendszer pontos feltérképezése céljából, mellyel a meglévő érszűkületek, érelzáródások nagysága és elhelyezkedése állapítható meg.

Ennek a vizsgálatnak az elvégzése alapvető fontosságú a további lehetséges kezelés eldöntése céljából.

A beavatkozás menete:

A vizsgálathoz használt behatolási hely leggyakrabban a lágyékhajlati és a felkar artéria.

Az érfestés során olyan kontrasztanyagot juttatnak be az artériás és/vagy a vénás rendszerbe, mely röntgen sugar alatt ezeket láthatóvá teszi, a szűkületek, elzáródások kimutathatóvá válnak.

Amennyiben lehetőség nyílik rá, akkor nem csak az érfestésre, de esetleg azonnali katéteres értágításra is sor kerülhet. A katéteres értágításon (ballonos angioplasztikán) túl szükség lehet ún. stent” behelyezésére is, mellyel a korábban beszűkült vagy elzáródott érszakasz belső „kísámfázása” oldható meg speciális, rugalmas vékony fémháló segítségével.

Kockázatok:

A beavatkozás során és az érfestés után a szúrás helyénél vérömleny keletkezhet (az esetek 3-4 %-ában), mely azonban általában egyéb kezelés nélkül, 10-12 nap alatt felszívódik. Igen ritka (0,2 % alatt) az az eset, amikor a létrejött vérömleny miatt érsebészeti feltárára van szükség. A beavatkozások során, a katéteres manipulációk közben igen ritkán érsérülések (0,1 % alatt), vagy érelzáródás (0,05 % alatt) is létrejöhet, melynek következtében azonnali érsebészeti műtét válhat szükségessé.

A kontrasztanyagnak az érzékenységi reakciók lehetnek enyhék (bőrviszketés, szájszárazság, torokkaparás, tüsszentés, álmoság, hányás, enyhe vérnyomás ingadozás – összességében 1 % alatt), de igen ritkán (néhány ezrelék!) lehetnek súlyosak is (gégeduzzanat, ájulás, epilepsziás roham, szívritmuszavar, jelentős vérnyomásesés vagy vérnyomásemelkedés). Mindezen lehetséges kontrasztanyag szövődmények elhárítására az érfestéses laborban felkészültek.

Az adott vizsgálat becsült sugarterheléséről a kifüggesztett tájékoztatóból, illetve az asszisztentstől kap tájékoztatást.

A beavatkozás utáni tennivalók: a beavatkozás után 24 órán keresztül fekvődni kell amennyiben a beavatkozás a lágyékhajlatból történt. Ha a beavatkozás karon keresztül történt a végtagot 24 órán keresztül kímélni kell, továbbá sok folyadékot kell fogyasztani.

A betegtájékoztató érvényességi ideje: a kiadás időpontjától számítva a dokumentum legalább két évente felülvizsgálat-köteles, amennyiben módosítás nem szükséges, úgy a dokumentum kétszer hosszabbítható (MF03 Dokumentumok, adatok és feljegyzések kezelése 5.10. fejezet).