

SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ	BETEGTÁJÉKOZTATÓ KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI OSZTÁLY	FNY1028/11-2020.06.08. Változat: 2
Tárgy: Betegtájékoztató ultrahang kontrasztanyag vizsgálatához		Oldalszám: 1/1

BETEGTÁJÉKOZTATÓ ULTRAHANG KONTRASZTANYAGOS VIZSGÁLATHOZ

Tájékoztató:

Az Ön esetében az ultrahang vizsgálat pontosságát növeli, azt kiegészíti a kontrasztanyag (SonoVue) ultrahang vizsgálat. A vizsgálat az Ön érdekeit szolgálja és melyet csak beleegyezése esetén végezzük el.

A vizsgálat lényege:

A SonoVue a véredények és testszövetek ultrahangvizsgálatánál használt kontrasztanyag.

A SonoVue több millió apró buborékot (mikrobuborékot) tartalmazó diszperzió. Minden buborék kisebb, mint egy vörösvértest. A buborékok visszaverik az ultrahang nyalábot, a testszövetektől eltérően és így javítják a képminőséget. Megkönnyíti az orvos számára a vizsgált testrészt vagy véredény felismerését, illetve a rendellenességek észlelését. A SonoVue segítségével vizsgálhatók a szívüregek, a nagy véredények, erek, valamint a legtöbb hasi szerv, így a máj és a vese szerkezete, erezettsége, vérellátása.

A gyógyszer kizárólag diagnosztikus célra készült, azonban segítségével bizonyos terápiás eljárások – mint például a radiofrekvenciás kezelés, selectív chemoembolisatio, angioplastica – eredményessége is jól feltérképezhető.

Mellékhatások:

A SonoVue klinikai vizsgálata során tapasztalt legtöbb mellékhatás enyhe és átmeneti volt. A leggyakrabban észlelt mellékhatások: fejfájás, hányinger, fájdalom, égő, horzsoló érzés vagy zsibbadás az injekció helyén.

A ritkábban tapasztalt mellékhatások: viszketés, kiütés, hasi, mellkasi vagy hátfájdalom, fájdalom általában, értágulat, vércukorszint emelkedése, homályos látás, torok irritáció, melléküregi nyomásemelkedés, testrészek zsibbadása, szédülés, alvászavar, elgyengülés, furcsa ízérzés.

Ön nem kaphat SonoVue-t, ha:

- myocardialis infarctusa (szívroham) volt és még mindig gyakori és/vagy ismételt szív tájéki vagy mellkasi fájdalmat érez,
- a közelmúltban szívkoszorúér beavatkozása volt,
- gyakori és/vagy ismételt szív tájéki vagy mellkasi fájdalmat érzett az elmúlt 7 napon belül
- szívégtelenségben szenved (NYHA III-IV),
- súlyos ritmuszavara van,
- szívében jobb-bal sőt van,
- súlyos mértékben emelkedett a tüdőartériák nyomása,
- beállíthatatlan magas vérnyomása van,
- felnőttkori légzési distressz szindrómája van.

Terhesség

A SonoVue-t nem vizsgálták terhes nőknél, ezért ilyenkor nem alkalmazzuk. A fejlődő magzatra várhatóan nem jelent veszélyt, de ez irányú statisztikai adat nem áll rendelkezésünkre. Ha terhes vagy úgy gondolja, hogy terhes lehet, közölje orvosával.

Szoptatás

Ha szoptat, közölje orvosával. Nem ismeretes, hogy a SonoVue átjut-e az anyatejbe.

A kezelés ideje alatt alkalmazott egyéb gyógyszerek:

A SonoVue és egyéb gyógyszerek között nem jeleztek kölcsönhatást. Mégis arra kérjük, hogy tájékoztassa a kezelőorvosát a jelenleg szedett gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható gyógyszereket is.

A betegtájékoztató érvényességi ideje: a kiadás időpontjától számítva a dokumentum legalább két évente felülvizsgálat-köteles, amennyiben módosítás nem szükséges, úgy a dokumentum kétszer hosszabbítható (MF03 Dokumentumok, adatok és feljegyzések kezelése 5.10. fejezet).