

<b>SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ</b>	<b>BETEGTÁJÉKOZTATÓ GASZTROENTEROLÓGIAI PROFIL</b>	<b>FNY1019/2-2020.11.05.</b> <b>Változat:3</b>
<b>Tárgy:</b> Betegtájékoztató az emésztőrendszer felső szakaszának endoszkópos ultrahang vizsgálatához		<b>Oldalszám:</b> 1/1

## **BETEGTÁJÉKOZTATÓ AZ EMÉSZTŐRENDSZER FELSŐ SZAKASZÁNAK ENDOSZKÓPOS ULTRAHANG VIZSGÁLATÁHOZ**

### **Tisztelt Betegünk!**

Az eddigi vizsgálatok eredményei alapján orvosa EUH (endoszkópos ultrahang) elvégzését javasolja. A vizsgálat elmagyarázását, illetve a vizsgálat kockázatának, lehetséges szövődményeinek említését követően kérjük, hogy beleegyezése jeléül írja alá az alábbi nyilatkozatot.

Az EUH egy biztonságos vizsgálat, mely lehetővé teszi a felső gasztrointesztinális traktus (nyelőcső, gyomor, nyombél) falának és a környező szöveteknek (medigatorum, hasnyálmirigy, epeutak, epehólyag, máj) ultrahanggal történő nagy felbontású ábrázolását és ez által hasznos információkkal egészíti ki a hasi ultrahang, CT, MRI vizsgálatok eredményét. A vizsgálat során a gyomortükrözésnél használatos endoszkópot (rugalmas cső, melynek végén fényforrás, videokamera és ultrahangfej van) vezetünk a száján keresztül a nyelőcsőbe, gyomorba, majd a nyombélbe. A vizsgálat éhgyomorral történik. A garat lidocainnal történő érzéstelenítését követően intravénás injekcióval bódítjuk (annyira éber marad, hogy kooperálni tudjon), hogy segítsük Önt az ellazulásban és minimalizáljuk a vizsgálat okozta kellemetlenséget. A vizsgálatot követően, ha szükséges 1-2 óráig megfigyeljük Önt. Vezetni az altató miatt aznap nem tanácsos; hozzon hozzátartozót magával, hogy hazakísérhesse. Az érzéstelenítő hatásának elmúlását követően (kb. 20 perc) lehet enni.

A vizsgálat során nagyon ritkán szövődmények léphetnek fel, úgy, mint a bélfal kilyukadása és vérzés, melyek gyakorisága megegyezik a rutin gyomortükrözés során fellépő szövődmények gyakoriságával. A bódításhoz használt injekció allergiás reakciót okozhat, mely rendszerint enyhe lefolyású és általában csak arra hajlamos egyéneken alakul ki.

Kérjük, informáljon, ha allergiás valamelyik gyógyszerre, műbillentyűje van, korábban endocarditisze volt, vérzékenysége, szív, tüdő, vesebetegsége van, véralvadásgátlót (heparin, Syncumar, Warfarin), vagy trombocita aggregáció gátlót (aspirin, clopidogrél, ticlopidin) szed, és ha Ön terhes.

**A betegtájékoztató érvényességi ideje:** a kiadás időpontjától számítva a dokumentum legalább két évente felülvizsgálat-köteles, amennyiben módosítás nem szükséges, úgy a dokumentum kétszer hosszabbítható (MF03 Dokumentumok, adatok és feljegyzések kezelése 5.10. fejezet).