

SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ	BETEGTÁJÉKOZTATÓ GASZTROENTEROLÓGIAI PROFIL	FNY1019/6-2020.11.05.
		Változat: 1
Tárgy: Betegtájékoztató a gyomor tükrözéses vizsgálatához		Oldalszám: 1/1

BETEGTÁJÉKOZTATÓ A GYOMOR TÜKRÖZÉSES VIZSGÁLATÁHOZ

Tisztelt Betegünk!

A vizsgálat célja a felső emésztőrendszer betegségeinek kórismézése.

Jelenleg ez a módszer a legkorszerűbb a nyelöcső, gyomor, nyombél betegségeinek (pl.: gyulladás, fekély, rosszindulatú daganat) felismerésére.

A vizsgálat előnye az ismert gyomorröntgen vizsgálatnál szemben, hogy a beavatkozás során szövettani mintavételre van lehetőség. Ez lehetőséget ad annak a tisztázására is, hogy fennáll-e a gyomor olyan bakteriális fertőzése – *Helicobacter pylori* – mely a fekély kialakulásában szerepet játszik; gyulladások, fekélyek vizsgálatára, lehetőséget ad polipok, daganatok mintavételezésére, esetlegesen eltávolítására, szenzitív glutén enteropathia diagnosztizálására. A vizsgálat további előnye, hogy lehetőség van beavatkozások elvégzésére is, úgymint vérzéscsillapítás, lenyelt idegentest eltávolítás, polipeltávolítás.

A vizsgálatra a betegek készülnie kell. A gyomortükrözés éhgyomorral történik, a vizsgálat napján sem szilárd, sem folyékony étel nem fogyasztható. A dohányzás is kerülendő. Az esetleges gyógyszerbevitelt a vizsgáló orvossal szükséges megbeszélni. Véralvadásgátló gyógyszerekről kezelőorvosát tájékoztassa.

A vizsgálat az alábbi módon történik: a beavatkozás során – a garat helyi érzéstelenítését követően egy ujjnyi vastag, hajlékony eszközt vezetnek le szájon át a nyelöcsőbe, majd a gyomron át a nyombélbe. A vizsgálat a beteg együttműködése esetén néhány percig tart, nem fájdalmas, szükség esetén a vizsgálat előtt a beteg nyugtató injekciót kap. A vizsgálat közben a beteg az orrán át zavartalanul tud lélegezni. Vizsgálat közben a hangadást kerülni kell.

A vizsgálat közben fellépő kellemetlenség nyugodt légvételekkel leküzdhető.

A vizsgálat gyakorlatilag szövődménymentes, mindenkinél elvégezhető.

Azonban mint minden orvosi beavatkozás esetén, úgy a gyomortükrözésnél is ritkán, kb. 10000 vizsgálatból 1 esetben előfordulhatnak szövődmények az érzéstelenítőszer vagy a nyugtatóinjekció iránti túlérzékenység, a műszer okozta sérülés, a szövettani mintavétel után esetleg kisebb vérzés alakulhat ki.

A vizsgálat után kb. 1 órán át nem szabad enni, inni, mert a garatérzéstelenítés miatt megnő a félrenyelés veszélye. Egyébként a beteg akadálytalanul folytathatja napi tevékenységét. Ha nyugtató injekcióban részesült, a vizsgálat napján gépkocsit vezetni nem szabad, ez esetben kísérelővel távozhat. Szokatlan panasz esetén a vizsgálatot végző orvost, ill. az osztályt haladéktalanul keresse fel.

Kérjük, amennyiben a vizsgálatnál kapcsolatban kérdése van, forduljon bizalommal a kezelőorvosához vagy a vizsgálatot végző orvoshoz.

Kérjük a vizsgálati lelet egy példányát őrizze meg, ismételt jelentkezéskor hozza magával.

A második példányt a beküldő orvosnak, ill. háziorvosának adja át.

A betegtájékoztató érvényességi ideje: a kiadás időpontjától számítva a dokumentum legalább két évente felülvizsgálat-köteles, amennyiben módosítás nem szükséges, úgy a dokumentum kétszer hosszabbítható (MF03 Dokumentumok, adatok és feljegyzések kezelése 5.10. fejezet).