

<b>SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ</b>	<b>BETEGTÁJÉKOZTATÓ GASZTROENTEROLÓGIAI PROFIL</b>	<b>FNY1019/9-2020.11.05.</b> <b>Változat: 2</b>
<b>Tárgy:</b> Betegtájékoztató a májbiopszia vizsgálatához		<b>Oldalszám: 1/1</b>

## BETEGTÁJÉKOZTATÓ A MÁJBIOPSZIA VIZSGÁLATHOZ

### Tisztelt Betegünk!

**A vizsgálat célja:** diffúz vagy gócos májbetegség kórismézése.

A beavatkozás során apró szövetmintát veszünk a májból, melynek szövettani feldolgozásával meg lehet állapítani az esetleg fennálló májbetegség jellegét, ami nélkülözhetetlen a gyógyszeres vagy egyéb kezelés megtervezéséhez.

A vizsgálatához a betegnek éhgyomorra kell lennie. Szükséges továbbá friss vérkép és véralvadási eredmények, valamint vércsoport vizsgálat elvégzése.

**A vizsgálat az alábbi módon történik:** Hanyattfekvő helyzetben elvégezzük a has jobb oldalán az elülső hónaljvonalban, bordaközben a bőr és a hasfal helyi érzéstelenítését Lidocain injekcióval – lokális érzéstelenítővel amennyiben érzékenység/allergia veszélye áll fenn –, bőrfertőtlenítést követően. Előfordul, hogy a májbiopszia ultrahanggal történő célzást igényel, ilyenkor elképzelhető hogy a szúrás nem bordaközéből történik.

A helyi érzéstelenítés után szikével vagy apró trokárral nyílást készítünk a bőrön ill. a bordaközi izomzaton a májbiopsziás tű számára. Ezt követően az elkészített szúrásatornán át a májszövetbe vezetjük a biopsziás tűt és vákuum segítségével szövethengert nyerünk a májból. Ezután a szúrás helyét nyomókötéssel látjuk el, amely 24 órán át fennmarad.

A vizsgálatot követően a beteg 6 óra hosszat fekszik, majd a következő 24 órában is csak wc-re mehet ki. A beavatkozást követően este ill. másnap reggel vérkép vizsgálat szükséges.

**A vizsgálat lehetséges szövődményei:** Az esetek 1-2 %-ban a bordaközéből történő szúrást követően kisebb légmell alakulhat ki. Ennél gyakrabban, az esetek 3-4 %-ban vérzés keletkezhet a májtok alatt vagy a hasüregben. Ennek megállapítása ultrahang ellenőrzéssel lehetséges. A májtok alatti bevérzés beavatkozást nem igényel, szigorú fekvés és vérkép ellenőrzés szükséges. A hasüregbe történő vérzésnél azonban mielőbbi műtéti feltárás és a szúrás helyének sebészi ellátása indokolt.

Kérjük, amennyiben a vizsgálatban kapcsolatban kérdése van, forduljon bizalommal a kezelőorvosához, vagy a vizsgálatot végző orvoshoz.

**A betegtájékoztató érvényességi ideje:** a kiadás időpontjától számítva a dokumentum legalább kétevente felülvizsgálat-köteles, amennyiben módosítás nem szükséges, úgy a dokumentum kétszer hosszabbítható (MF03 Dokumentumok, adatok és feljegyzések kezelése 5.10. fejezet).