

<b>SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ</b>	<b>BETEGTÁJÉKOZTATÓ GASZTROENTEROLÓGIAI PROFIL</b>	<b>FNY1019/7-2020.11.05.</b> <b>Változat: 1</b>
<b>Tárgy:</b> Betegtájékoztató a vastagbél tükrözéses vizsgálatához		<b>Oldalszám:</b> 1/1

## **BETEGTÁJÉKOZTATÓ A VASTAGBÉL TÜKRÖZÉSES VIZSGÁLATÁHOZ**

### **Tisztelt Betegünk!**

**A vizsgálat célja** a vastagbél betegségeinek kórismézése.

A vizsgálat előnye a röntgenvizsgálattal szemben, hogy a beavatkozás során szövettani mintavételre van lehetőség. A vizsgálat további előnye, hogy lehetőség van a beavatkozások elvégzésére is, úgymint vérzéscsillapítás, polipeltávolítás, daganatrontcsolás.

**A vizsgálatra a betegnek készülnie kell.** A vizsgálat előtt a vastagbél gondos kitisztítása szükséges. Ehhez a vizsgálat előtti napokon az orvossal megbeszélte diétát kell tartani, majd a hashajtással, beöntésekkel, ill. ezek együttes alkalmazásával a belet tisztítani kell. A vizsgálat előtt folyadékot bőven szabad, ill. kell fogyasztani. A vizsgálat napján a szokásos gyógyszereket be kell venni.

**A vizsgálatot megelőzően** kezelőorvosát feltétlenül tájékoztassa gyógyszereszedéséről (pl.: véralvadástlók).

**A vizsgálat az alábbi módon történik:** a beavatkozás során egy ujjnyi vastag, hajlékony eszközt vezetnek be a végbélnyíláson át, bizonyos műtétek után a hasfalra kivezetett sztomán át a vastagbélbe egyidejű levegőbefúvással, ami feszülő érzést okozhat.

A vizsgáló orvosnak, aki a levegő leszívásával, az eszköz helyzetének változtatásával ezen segíteni igyekszik. Bizonyos esetekben a vizsgálatához fájdalomcsillapító injekcióra lehet szükség. Injekció adása ill. a vizsgálat után kórházi megfigyelés válhat szükségessé.

A vizsgálat időtartama a körülményektől függően 10-60 perc. A vizsgálatot követően hasi puffadásérzés maradhat.

**A vizsgálat lehetséges szövődményei:** kb. 1000 vizsgálatból 1-2 esetben az alkalmazott injekció iránti túlérzékenység. Bekövetkezhet még műszer okozta bélsérülés hasonló arányban melynek kezelésére azonnali műtét lehet szükséges. A szövettani mintavétel, ill. polypeltávolítás után esetleg kisebb-nagyobb vérzés alakulhat ki, melynek valószínűsége 6-8 %.

**A vizsgálat után,** ha nyugtató injekcióban részesült, a vizsgálat napján gépkocsit vezetni nem szabad, kísérőt feltétlenül hozzon magával ez esetben. Szokatlan panasz esetén a vizsgálatot végző orvost, illetve az osztályt haladéktalanul keresse fel.

Kérjük, amennyiben a vizsgálattal kapcsolatban kérdése van, forduljon bizalommal a kezelőorvosához vagy a vizsgálatot végző orvoshoz.

Kérjük, a vizsgálati lelet egy példányát őrizze meg, ismételt jelentkezéskor hozza magával. A második példányt a beküldő orvosnak, ill. házi orvosának adja át.

Friss alvadási paraméterek, vérkép, vércsoport szükséges.

**A betegtájékoztató érvényességi ideje:** a kiadás időpontjától számítva a dokumentum legalább két évente felülvizsgálat-köteles, amennyiben módosítás nem szükséges, úgy a dokumentum kétszer hosszabbítható (MF03 Dokumentumok, adatok és feljegyzések kezelése 5.10. fejezet).