

<b>SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ</b>	<b>BETEGTÁJÉKOZTATÓ GASZTROENTEROLÓGIAI PROFIL</b>	<b>FNY1019/5-2020.11.05.</b>
<b>Tárgy:</b> Betegtájékoztató az epeutak és a hasnyálmirigy tükrözéséhez röntgenábrázolásos vizsgálatához (ERCP)		<b>Változat: 1</b> <b>Oldalszám: 1/1</b>

## **BETEGTÁJÉKOZTATÓ AZ EPEUTAK ÉS A HASNYÁLMIRIGY TÜKRÖZÉSÉHEZ RÖNTGENÁBRÁZOLÁSOS VIZSGÁLATÁHOZ (ERCP)**

**A vizsgálat célja** az emésztőrendszer felső részének, az epeutak és a hasnyálmirigy betegségeinek kórismézése. A módszer lehetőséget ad a szűkült, epeelfolyást akadályozó epevezeték beszájadásának elektromos késsel történő bemetszésére, epekövek eltávolítására, szűk epeúti szakaszok területéről való szövettani mintavételére.

**A vizsgálatra a betegnek készülnie kell.** A vizsgálat éhgyomorral történik, a vizsgálat napján sem szilárd, sem folyékony étel nem fogyasztható. A dohányzás is kerülendő. Az esetleges gyógyszerbevételt a kezelőorvossal szükséges megbeszélni, pl.: véralvadásgátlók!

**A vizsgálat az alábbi módon történik:** a beavatkozás során – a garat hely érzéstelenítését követően – egy ujjnyi vastag, hajlékony eszközt vezetnek le szájon át a nyelőcsőbe, majd a gyomron át a nyombélbe. Itt vékony katéteren keresztül röntgen kontrasztanyagot fecskendeznek be az epe – ill. hasnyálmirigy-vezetékbe. A vizsgálat előtt a beteg nyugtatót és bélmozgást gátló injekciót kap. A vizsgálat előtt a beteg orrán át zavartalanul tud lélegezni. Vizsgálat közben a hangadást kerülni kell.

**A vizsgálat lehetséges szövődései:** az érzéstelenítőszer, nyugtató injekció vagy a kontrasztanyag iránti túlérzékenység előfordulhat az esetek mintegy 0,5 % -ban.

Az epevezeték záró izomzatának felmetszését követően az alábbi szövődések fordulhatnak elő: 1-2%-ban kisebb vagy esetleg nagyobb mértékű vérzés bekövetkezhet. A vékonybél átfürödése a vágás során ennél kisebb arányban 1000 vizsgálatból 1-2 alkalommal fordulhat elő. Ennél nagyobb mértékben a beavatkozások 5-8 % -ban enyhe, közepesúlyos vagy igen ritkán súlyosabb hasnyálmirigy izgalom ill. valódi gyulladás is kialakulhat.

Hasonló arányban előfordulhat a beavatkozást követő hőemelkedés vagy lázas állapot.

Extrém ritkán előre ki nem számítható módon különösen idős súlyos keringési betegségben szenvedő pácienseknél a vizsgálat közben hirtelen halál is bekövetkezhet.

**Kérjük, amennyiben a vizsgálattal kapcsolatban kérdése van, forduljon bizalommal a kezelőorvosához vagy a vizsgálatot végző orvoshoz.**

Kérjük, a vizsgálatit lelet egy példányát őrizze meg, ismételt jelentkezésekor hozza magával.

A második példányt a beküldő orvosnak ill. háziorvosának adja át.

A vizsgálatot megelőzően friss véralvadás, vércép, vércsoport szükséges, amennyiben a – beteg ambulánsan jelentkezik.

**A betegtájékoztató érvényességi ideje:** a kiadás időpontjától számítva a dokumentum legalább két évente felülvizsgálat-köteles, amennyiben módosítás nem szükséges, úgy a dokumentum kétszer hosszabbítható (MF03 Dokumentumok, adatok és feljegyzések kezelése 5.10. fejezet).